

# DOSIFICACIÓN CEREBROLYSIN

---

## DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

### Infusión intravenosa

**Nota:** La aplicación intramuscular o intravenosa directa debe ser usada a criterio del médico tratante, en un rango de dosificación no mayor a 5ml por vía intramuscular y no mayor a 10ml por vía endovenosa directa.

### Modo de uso y dosificación:

Durante el EVC, la aplicación por infusión intravenosa 50 ml (5 ampolletas) diluidas en 100 a 250 ml de solución salina en intervalos de 60 a 90 minutos cada 24 horas por 10 a 20 días.

El inicio de tratamiento debe ser lo antes posible, es importante señalar que no se requiere esperar al diagnóstico diferencial entre el tipo de EVC isquémico o hemorrágico, lo cual significa beneficios relevantes para el paciente.

Posterior a las dosis aplicadas en el proceso del EVC, se recomienda dar continuidad bajo aplicaciones de 2 veces por semana, misma dosis 50 ml diluidos en 100 a 200 ml de solución salina en un intervalo de 60 a 90 minutos.

### Tiempo de descanso:

Este debe ser igual al tiempo de tratamiento, en este caso 2 aplicaciones por semana una semana de descanso la recomendación de esta dosificación, más rehabilitación física se recomienda por un mínimo de tres meses, posteriormente se puede reducir a una aplicación por semana por una de descanso.

La tolerancia de cerebrolysin permite al médico ajustar las dosis y frecuencia en rangos muy amplios en función de los requerimientos vs respuesta del paciente.